




အသည်းရောင်အသားဝါ(ဘီ) ရောဂါဒ္ဒာကြော်းချောင်းဆေ



- အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါသည် အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ပိုင်းရပ်စိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အသည်းရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်၍ ရုတ်တရက်ဖြစ်သော အသည်းရောဂါ နှင့် နာတာရှည်အသည်းရောဂါဟူ၍ (၂) မျိုးဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
- Global Hepatitis Report (2017) အရ ကမ္မာပေါ်တွင် အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူ စုစုပေါင်း (၂၅၃) သန်း ရှိပါသည်။
- ၂၀၁၅ ခုနှစ် စစ်တစ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၆.၅% ခန့်သည် အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါခံစားမော်ပါသည်။
- အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါ၏ မှာက်ဆက်တဲ့ ပြဿနာ များအဖြစ် အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့် အသည်းကင်ဆာရောဂါတို့ ဖြစ်စေတတ်၍ အသက်သေဆုံးနိုင်ပါသည်။

ရောဂါလက္ခဏာများ

- များခြင်း၊ မောပန်းနှစ်းနယ်ခြင်း။
- အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ပျိုးအန်ခြင်း၊ စိုက်အောင့်ခြင်း။
- ဆီးအရောင်ရှင်ခြင်း။
- အသားဝါခြင်း၊ မျက်လုံးဝါခြင်း။
- အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ကိုခံခြင်း။

အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်သော နည်းလမ်းများ



ရောဂါပိုးရှိသောမီစိစင်မှုကလေးသို့ ကလေးမွေးဖွားစဉ်တွင် ကူးစက်ခြင်း (ကူးစက်နိုင်ခြေအများဆုံး) :



ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူနှင့် အကာအကွယ်မှု လိုင်ဆက်ဆောင်ခြင်း။



ရောဂါပိုးပါဝင်နေသော သွေး၊ ဓနာကိုယ်မှုတွက်သော အရည်များ၊ တံတွေးများ၊ ရာသီသွေးများ၊ မိန့်မကိုယ်မှု တွက်သော အရည်များ၊ ယောက်ရှားသုတေသန စသည်တို့နှင့် ထိုတွေမီခြင်း။



အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ပိုးပါသော သွေးသွေးသွင်းမီခြင်း။



ရောဂါပိုးပါသောအပ်များဖြင့် ဆေးထိုးခြင်း၊ သွေးဖောက်ခြင်း၊ နားဖောက်ခြင်း၊ အပ်စိုက်ခြင်း၊ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်း၊



ရောဂါပိုးရှိသောသူနှင့် သွားတိုက်တဲ့၊ သွားကြားထိုးတဲ့၊ မှတ်ဆိတ်ရိုက်တဲး အတွေ့တွေသုံးခြင်း။

အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရသူများ

- မကြာခဏ သွေးသွင်းကုသမှုခုယူရသူများ၊
- နာတာရှည်ကြောက်ရောဂါရှိ၍ ကြောက်ကပ်ဆေးရလေ့ရှိသူများ၊
- ကိုယ်တွင်းအိုး အစားထိုးကုသမှုခုယူရသူများ၊
- မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးကြာအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းလေ့ရှိသူများ၊
- ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူနှင့် အကာအကွယ်မှု လိုင်ဆက်ဆောင်မှုရှိသူများ၊
- လိုင်ဆက်ဆောင်မှုရှိသူများ၊
- လုပ်ငန်းခွင်တွင် သွေး(သို့) သွေးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့် ထိုတွေ မှုရှိသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊

အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါကာကွယ်နိုင်သောနည်းလမ်းများ

- အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း - အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ပိုးကူးစက်မဲခံရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေး (Hepatitis B Vaccine) ကို အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှင့်၊
- ကမ္မာကျိုးမာရေးအဖွဲ့၏ အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှင့် မွေးကင်းစကလေးအေးလုံးကို ဓမ္မားဖြူးပြီး (၂၄) နာရီအတွက် အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှင့်၊
- မလိုအပ်ဘဲဆေးထိုးခြင်းများမှ ရောင်ကြုံရန်၊
- ရောဂါပိုး (Malaria, HIV, Syphilis, HCV နှင့် HBV) ကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်သော သွေးကိုသာသွင်းရန်။

**အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ပိုးကာကွယ်ဆေး
ပစ္စ်နှင့်ရောဂါးနှင့် ထိုးနှင့်သာသွင်းသည်**

အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါ ကုသွင်းနည်းလမ်းများ

- လုလောက်စွာအနားယူပါ၊ အနားယူခြင်း သည် အကိုကဗုထုံး ဖြစ်သည်။
- အရက်သောက်ခြင်းမှ ရောင်ကြုံပါ။
- အသားရှုပြည့်စွာ စားသောက်ပါ။
- မောပန်းနှစ်းနယ်စေသော အလုပ်များကို ရောင်ကြုံပါ။
- သောက်ဆေး (Tenofovir သို့မဟုတ် Entecavir) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထိုးဆေး (Interferon) ဖြင့်လည်းကောင်း ကုသွင်းသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါဆေးများသည် အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ) ရောဂါအား အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကပ်းအောင် ကုသွင်းပျိုးများ မဟုတ်ဘဲ ရောဂါပိုးများ ထပ်မံ့ပွားများခြင်းမရှိအောင် ဟန်တားထားခြင်းသာ ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်သက်တာလုံး ဆရာဝန်အောင်ကြားသည့်အတိုင်း ဆေးသောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။

